

にこにこ通信

第 68 号
2020 年
10 月発行

ロタウイルスワクチンが定期接種(公費)になりました

令和２年 10 月１日より、ロタウイルスワクチンが定期接種となりました。**令和２年８月１日以降に生まれたお子さんが対象で、定期接種（公費対象）は令和２年 10 月１日以降**の接種が対象となります。ワクチンを接種し、ロタウイルス感染症を予防しましょう。

看護師　大窪

ロタウイルス感染症とは・・

激しい下痢や嘔吐によって脱水を起こしやすく、乳幼児に感染するともっとも重症化しやすいウイルス性胃腸炎です。

◆症状・合併症

嘔吐、下痢、発熱で嘔吐は１～２日みられ、下痢は３日から 10 日間続きます。発熱は４０℃くらいが数日～１週間続くこともあります。まれに脳炎・脳症、肝機能障害、腎障害を起こすこともあり、重症感染症の１つです。

ワクチンをいつ、何回接種しますか？

ロタウイルスワクチンは**口から飲む生ワクチンです。ロタリックス（RV1、１価）とロタテック（RV5、５価）の２種類**があります。いずれも毒性を弱くしたロタウイルスが用いられています。ワクチンには**甘い味**がついていて、赤ちゃんでも飲みやすく作られています。両ワクチンは、**生後６週から初回接種**を開始し、少なくとも４週間の間隔をおいて、**１価ワクチンは２回、５価ワクチンは３回**の接種を行います。標準的な接種スケジュールは裏面の表を確認ください。

★ロタワクチン接種後（特に１週間以内）はわずかに腸重積のリスクが高まると言われています。できるだけ腸重積の起こりにくい時期に受けましょう（１回目は１４週６日までに）



ワクチンの効果について・・・

両ワクチンとも感染を 100%防ぐものではありません。

1. ロタウイルス胃腸炎を約 70～80%予防できます。
2. 入院や点滴が必要となる重症例に関しては 95%ほど予防できます。
3. この予防効果は生後**６カ月から２歳頃まで続きます。**
4. 抵抗力が弱く重症化しやすい２歳以下の乳幼児に有効な予防接種です。

接種スケジュールについて



自然に感染すると免疫はできますが、ロタウイルスには、たくさんの種類があり、特に初回の感染は重くなります。**かかる前にワクチンを接種して免疫をつけることが、子どもたちのために大切です。**接種できる時期がきまっており、過ぎたら接種できませんのでご注意ください。

子どもの安全について　最近、こどもの車に関する事故が増えています。安全を確保するために保護者ができる予防策を考えてみましょう。　看護助手　田中

～自動車関連の事故～

★チャイルドシート未使用による事故★

０から６歳に多い

①泣くからかわいそうと思って抱っこしたまま乗ると、衝突や急停車の際、支えきれずにこどもが腕から飛び出し危険です。

②短時間の乗車であってもチャイルドシートを使用しましょう。

③６歳になるまでは必ずチャイルドシートを使用しましょう。

★車のドアやパワーウインドに挟まれる事故★

０から３歳に多い

①車のドアやパワーウインドを閉める時には、こどもの顔や手が出ていないか確認し、閉める前に一声かけましょう。

②こどもが自分で開け閉めが出来ないようにロックをかけましょう。

★車内での熱中症★

①こどもを車内に残したままにしていると、特に暑い季節は車内の温度が上昇し、熱中症になる恐れがあります。

②少しの間でも、こどもだけを車の中に残しておかないようにしましょう

編集後記

朝晩涼しくなり、日中も過ごしやすくなりました。今年は新型コロナ感染症で、なかなか外出しづらいですが、外でこどもと一緒に気分転換できるといいですね。

もりもとこどもクリニック　診療案内

診療時間　午前　8:30～12:30
午後　16:00～18:00（土曜日17:30）
健診・予防接種　14:30～16:00（予約制）
休診日　木曜午後 ・ 第4土曜日 ・ 日祝日
ＴＥＬ　0877－25－9228
HPアドレス　http://www.morimoto-kodomo-clinic.com